

**Отдел по координации сельскохозяйственного производства  
и продовольственного рынка администрации  
Надеждинского муниципального района информирует.**

**ВНИМАНИЕ!**

**АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ (АЧС)**

**(МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ)**

Африканская чума свиней (далее – АЧС) остается главной угрозой развитию свиноводства в Приморском крае.

По сообщению Приморского межрегионального управления Россельхознадзора 13.05.2023 на территории свиноводческого комплекса «Ленинский-2» ООО «Русагро-Приморье», с. Первомайское Михайловского муниципального района Приморского края выявлено заболевание поголовья африканской чумой свиней.

В настоящее время существует реальная угроза заноса возбудителя заболевания и на территорию Надеждинского муниципального района.

В связи с угрозой заноса возбудителя африканской чумы свиней на территорию Надеждинского муниципального района просим владельцев свиней профилактические мероприятия по заболеванию африканской чумой свиней в соответствии приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 28.01.2021 № 37 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение и ликвидацию очагов африканской чумы свиней».

Африканская чума свиней – особо опасная вирусная болезнь домашних и диких свиней, характеризующаяся быстрым распространением, высокой степенью летальности и высоким экономическим ущербом.

Африканская чума свиней опасности для жизни и здоровья людей не представляет!

Источником возбудителя болезни являются больные и переболевшие свиньи. Животные заражаются главным образом при поедании кормов, пораженных вирусом. Особую опасность представляют продукты убоя зараженных свиней (мясо, мясопродукты, сало, кровь, кости, шкуры и др.) Инфицированные вирусом пищевые и боенские отходы, используемые для кормления свиней без тщательной проварки – основная причина заражения свиней африканской чумой.

Симптомы заболевания. Период заболевания от заражения до появления первых признаков болезни зависит от количества, поступившего в организм вируса, состояния животного, тяжести течения и может продолжаться от 2 до 6 суток. Болезнь начинается с повышения температуры до 41-42<sup>0</sup>С, одновременно с повышением температуры отмечается угнетение, залеживание и неохотное поедание корма. Затем наблюдается шаткость при движении, признаки воспаления легких, кашель. В этот период появляется сильное покраснение конъюнктивы глаза и других видимых оболочек, резко выражено посинение кожи с множественными кровоизлияниями. На коже в области внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей заметны красно – фиолетовые пятна, при надавливании они бледнеют. Иногда отмечают расстройство пищеварения, беременные свиноматки abortируют. Больные животные погибают в состоянии крайнего истощения.

Лечение и профилактика. Эффективных средств профилактики африканской чумы свиней до настоящего времени не разработано, лечение запрещено. В случае появления очага инфекции практикуется тотальное уничтожение больного свинопоголовья бескровным методом, а также ликвидация всех свиней в очаге и радиусе 20 км от него. Больные и контактирующие с больными животными свиньи подлежат убою с последующим сжиганием трупов.

Руководителям сельскохозяйственных предприятий, а также гражданам, содержащим свиней на личных подворьях, необходимо соблюдать ряд правил, выполнение которых позволит предотвратить заражение животных и избежать экономических потерь:

Руководителям сельскохозяйственных предприятий перевести предприятия в «Закрытый» режим работы, исключив возможность посещения предприятий посторонними гражданами, а также проникновения на их территорию бродячих и диких животных;

Владельцам личных подсобных хозяйств и мелкотоварных ферм обеспечить безвыгульное содержание свиней (свободный выгул свиней, особенно в лесных зонах, запрещен);

Регулярно предоставлять поголовье свиней для проводимых ветслужбой вакцинации (против классической чумы свиней, рожи и др.);

Проводить регулярные обработки свиней, а также свиноводческих помещений от кровососущих насекомых, постоянно вести борьбу с грызунами;

Не завозить свиней без согласования с Государственной ветеринарной службой;

Не использовать для кормления животных корма, не прошедшие термическую обработку (проварку), особенно корма животного происхождения;

С учетом рекомендаций Минсельхоза России необходимо биологически незащищенные (I и II компартмент) хозяйства всех категорий (включая личные подсобные хозяйства граждан), занятые разведением свиней, перевести на альтернативные виды животноводства. В целях недопущения заноса и распространения АЧС на территории края, Россельхознадзор России планирует при приближении очагов АЧС на сопредельной территории КНР на расстояние 100 км и менее инициировать мероприятия по закрытию производства свинины в биологически незащищенных (I и II компартмент) хозяйствах всех категорий (включая личные подсобные хозяйства граждан).

В связи с угрозой заноса возбудителя африканской чумы свиней на территорию Надеждинского муниципального района просим владельцев свиней профилактические мероприятия по заболеванию африканской чумой свиней в соответствии методическими рекомендациями Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Обо всех случаях внезапной гибели, как домашних, так и диких животных необходимо немедленно информировать КГБУ «Надеждинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», адрес: 692480, Приморский край, п. Новый, ул. Ленина, д. 19, телефон: 8-(42334)-37-230, E-mail: nfkgu@mail.primorye.ru